

KOPRA PESAKONDADE LOENDUSE METOODIKA

Jahimaa kasutajad annavad iga-aastaselt hinnangu kopra arvukuse muutusele jahipiirkonnas ning vastavad tulemused esitatakse koos teiste jahindusstatistiliste andmetega kevadel. Samas on kopra leviku ja arvukuse täpsemaks hindamiseks vajalik iga 3 aasta järel läbi viia pesakondade kaardistamine. Pesakondade kaardistamise aluseks on muude tegevuste käigus või spetsiaalselt selleks tehtavad välitööd, kus otsitakse kobrastele sobivatel veekogudel nende värskeid tegevusjälgi ning üritatakse nende põhjal eristada pesakondi teineteisest. Koprade on territoriaalsel loomad, erinevate pesakondade territooriumid omavahel reeglina ei kattu ning sageli on nende vahel ka tegevusjälgedeta või väheste tegevusjälgedega nn puhvertsoonid. Territooriumi suurus sõltub paljudest erinevatest asjaoludest, nagu näiteks kobraste asustustihedus, veekogu iseloom, sobivate toidutaimede (sobivate puuliikide) olemasolu jne. Kopra pesakondade loendust tehakse sügisel oktoobrist detsembrini, mil koprade koguvad aktiivselt talvevarusid. Sel ajal on nende tegevus kontsentreerunud peaurgude lähedusse, mistõttu on erinevad pesakonnad teineteisest lihtsamini eristatavad. Kaardistatakse vaid need pesakonnad, kus on olemas värskeid tegevusjäljed – langetatud puud, ehitatud või remonditud tammid, oksakogumitena vette kogutud talvevarud. Talvevaru järgi ongi parim määrata pesakonna olemasolu ja selle peaurgude (tsentri) asupaika. Territoriaalsete kobraste olemasolu kinnitavad ka territooriumi tähised nn haisumättad. Pesakonna territooriumi märgistatakse aktiivsemalt just selle servaaladel kevad- ja suveperioodil, märgistamise intensiivsus sõltub ka kopra asustustihedusest veekogul. Erinevate koprapesakondade kaardistamisel kasutada GPS-seadet; loenduslehele märgitakse pesakonna tsentri geograafilised koordinaadid ja info veekogu tüübi, pesakonna vanuse, talvevarude olemasolu, tammide arvu ja üleujutatud ning liigniiske ala suuruse kohta.