

## Lindude gripi seire meetodika

Seoses sellega, et Euroopas levib nii mets- kui ka kodulindude hulgas lindude gripp (peamiselt H5N8) palume teavitada Veterinaar- ja Toiduameti maakonna veterinaarkeskust juhul :

- Kui oled leidnud 5 värsket veelinnu korjust või oled tuvastanud ebatavalise veelindude surevuse orienteeruvalt 100 m ulatuses mererannas
- Kui oled leidnud rohkem kui 10 lähestikku asuvat surnud metslinnu värsket korjust maastikul või metsas

Värsket surnud linnu korjust panna lekkekindlasse kilekotti, markeerida ning anda üle veterinaarametnikule. Transportimisel tagada temperatuur +2 kuni +4°C.

Suurelt veelinnult või röövlinnult võtta tampooniproov.

Tampooniproovid kohe pärast võtmist jahutada +2 kuni 4°C-ni, paigutades need esimesel võimalusel külmkappi või asetades jääle või külmkehadele.

Kui proovid ei jõua laborisse 48 tunni jooksul, tuleb need kindlasti sügavkülmutada -20°C juures.

Maakonna veterinaarkeskuste kontaktid:

Harjumaa Veterinaarkeskus Tel 6580420  
Hiiumaa Veterinaarkeskus Tel 4622030  
Ida-Virumaa Veterinaarkeskus Tel 3366774  
Jõgevamaa Veterinaarkeskus Tel 7720201  
Järvamaa Veterinaarkeskus Tel 3854520  
Läänemaa Veterinaarkeskus Tel 4724791  
Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus Tel 3232050  
Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus Tel 3232050  
Pärnumaa Veterinaarkeskus Tel 4471614  
Põlvamaa Veterinaarkeskus Tel 799 4413  
Raplamaa Veterinaarkeskus Tel 4892590  
Saaremaa Veterinaarkeskus Tel 4531273  
Tartumaa Veterinaarkeskus Tel 7401208  
Valgamaa Veterinaarkeskus Tel 7666712  
Viljandimaa Veterinaarkeskus Tel 4350020  
Võrumaa Veterinaarkeskus Tel 7824051

Teavita leiust ka Veterinaar- ja Toiduameti peamaja e-mailil:

[peamajastaap@vet.agri.ee](mailto:peamajastaap@vet.agri.ee)

Lindude gripp on väga nakkav, ägedalt kulgev lindude viirushaigus. Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka kuna põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt suremust ning ulatuslikku majanduslikku kahju. Lindude gripile on vastuvõtlikud kõik kodu- ja uluklinnud. Nakkusallikaks on haiged või haiguse läbipõdenud

viirusekandjad linnud. Lindude nakatumine toimub seedetrakti või hingamisteede kaudu. Haigete lindude ravi puudub.

Gripiviiruse kandjateks looduses on metslinnud (peamiselt veelinnud), kellelt võivad nakkuse saada kodulinnud, eelkõige koduveelinnud nagu haned ja pardid. Metslindude hulgas levib nakkus valdavalt ilma nähtavate haigustunnusteta, kuid kõrge patogeensusega viirustüved põhjustavad tervisehäireid ka metslindudel.

Praegu Euroopas levinud viirustüvi H5N8 ei ole teadaolevalt inimesele ohtlik. Seni ei ole ECDC (Euroopa haiguste ennetamise ja kontrolli keskus) andmetel inimeste seas registreeritud ühtegi haigusjuhtu. ECDC hinnangul on risk inimeste jaoks väga väike.